



**FACULTATIVOS ESPECIALISTAS DE AREA
ESPECIALIDAD: MEDICINA INTERNA**

**RESPUESTAS CORRECTAS AL CASO CLÍNICO REALIZADO EL
02 MARZO 2008 (TURNO MAÑANA)**

CASO CLÍNICO A

Nº PREGUNTA	PUNTUACION MÁXIMA	RESPUESTA
1	4	<ol style="list-style-type: none">1. Reflejos: 1.2 puntos2. Sensibilidad: 1.2 puntos3. Antecedentes familiares: 0.8 puntos4. Antecedentes tóxicos: 0.8 puntos5. Presencia de edema: 0.4 puntos6. Tacto rectal: 0.4 puntos7. Pulso periférico: 0.4 puntos8. Lesiones cutáneas: 0.4 puntos
2	5	<ol style="list-style-type: none">1. ENG (Electroneuromiografía): 2 puntos2. Analítica básica de orina o Proteinuria: 2 puntos3. Vit. B12 y fólico: 0.5 puntos4. Pruebas reumáticas (ANA, ANCA, FR, complemento , crioglobulina): 0.5 puntos5. Serología (VIH, VHB, VHC, Lues, Lyme): 0.5 puntos6. Marcadores tumorales: 0.5 puntos7. Porfirinas: 0.5 puntos
3	3	<ol style="list-style-type: none">1. Descripción pormenorizada, incluyendo referencia a contraste oral e intravenoso, órganos sin hallazgos patológicos y estructuras óseas con resultado final de TAC normal: 3 puntos2. Descripción de los órganos, con resultado final de TAC normal: 2.5 puntos3. TAC Normal: 2 puntos
4	5	<p>A: Polineuropatía mixta axonal y desmielinizante y proteinuria nefrótica: 2.5 puntos.</p> <p>B:</p> <ul style="list-style-type: none">• Amiloidosis: 1 punto

		<ul style="list-style-type: none"> • Conectivopatías: 1 punto • Neoplasias: 1 punto • Carenciales: Déficit de vitaminas B1, B6, B12: 0.25 puntos • Metabólicas: DM , Acromegalia, IR: 0.25 puntos (cita DM) • Fármacos y tóxicos: 0.25 puntos • Infecciosas: VIH, Lyme, Zoster: 0.25 puntos • Inflamatorias: CIPD, Guillen-Barré: 0.25 puntos • Hereditarias: 0.25 puntos • Sarcoidosis: 0.25 puntos
5	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biopsia nervio y/o grasa: 3,2 puntos 2. Biopsia rectal: 2,2 puntos 3. Biopsia renal: 2,2 puntos 4. Cadenas ligeras en orina: 0.8 puntos
6	4	<p>A:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Amiloidosis primaria con polineuropatía y síndrome nefrótico: 1.4 puntos. <p>B:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tratamiento estándar: Melfalan (0.15 mg/kg/peso al día) con o sin prednisona (0.8 mg/kg/peso al día): 2 puntos. 2. Dexametasona e interferon alfa: 0.2 puntos. 3. Talidomida: 0.2 puntos. 4. Trasplante de células hematopoyéticas: 0.2 puntos

Estas listas de respuestas son una aproximación consensuada del tribunal, basada en la evidencia disponible. Cualquier otra respuesta no se puntuará, salvo que sea razonable a juicio de los miembros del tribunal, en cuyo caso será considerada y ponderada en su valoración.

CASO CLÍNICO B

Nº PREGUNTA	PUNTUACION MÁXIMA	RESPUESTA
1	4	<p><i>1 A Exploración neurológica (máximo: 1.5 puntos)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Marcha: 0,5 puntos • Rigidez de nuca: 0,5 puntos • Fuerza en miembros: 0.5 puntos • Reflejos osteotendinosos: 0.5 puntos • R. cutáneo plantares: 0,5 puntos • Pares craneales (facial): 0.5 puntos • Sensibilidad: 0,5 puntos <p><i>1 B Rx tórax PA (máximo: 1.5 puntos) :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Discreta hiperinsuflación pulmonar: 0,2 puntos • Hilio derecho patológico aumentado de tamaño: 1 punto • Posible ensanchamiento mediastínico 0.3 puntos <p><i>1 C Técnica de imagen de elección:</i></p> <p>TAC de Cráneo: 1 punto</p> <p>RM de cráneo: 0.7 puntos</p> <p>TAC torácico o tóracoabdominal: 0.3 puntos</p>
2	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. TAC TORÁCICO: 2 puntos 2. FIBROBRONCOSCOPIA: 1 puntos 3. EMG (Electroneuromiografía): 1 puntos 4. Mediastinoscopia: 0.2 puntos 5. PET: 0.2 puntos 6. Gammagrafia pulmonar: 0.2 puntos
3	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adenopatías de tamaño significativo a nivel hiliar: 2 puntos. 2. Adenopatías mediastínicas : 1 punto 3. Masa hiliar derecha : 1 punto.
4	5	<p>A. Adenopatías hiliares bilaterales con parálisis facial periférica y polineuropatía 1 punto</p> <p>B.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarcoidosis: 1.4 puntos 2. Linfoma: 0.9 puntos 3. Carcinoma broncogénico: 0.9 puntos 4. Metástasis: 0.4 puntos 5. Tuberculosis: 0.4 puntos

		6. Hongos: 0.2 puntos
5	5	<p>A. Metilprednisolona 1mg Kg/día: 2 puntos</p> <p>B. ECA: 79 U/L (8-52): 1.5 puntos</p> <p>C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mediastinoscopia: Biopsia adenopatía: 1.5 puntos • Tomografía por emisión de positrones (PET): 0.5 puntos
6	4	<p>A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Linfadenitis granulomatosa de tipo sarcoideo: 2 puntos. <p>B.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sarcoidosis con afectación mediastínica, y neurológica: 2 puntos • Neurosarcoidosis con parálisis facial periférica y polineuropatía periférica sistémica de origen mixto. 1 punto

Estas listas de respuestas son una aproximación consensuada del tribunal, basada en la evidencia disponible. Cualquier otra respuesta no se puntuará, salvo que sea razonable a juicio de los miembros del tribunal, en cuyo caso será considerada y ponderada en su valoración.